

# 20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới

20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới (thuoc-tri-sui-mao-ga) Bạn nên biết sùi mào gà có khả năng dẫn đến rất nhiều sự bất tiện, hậu quả tới quá trình sinh hoạt của người bị bệnh, người mắc bệnh sẽ trở nên nhạy cảm, dễ bị nhiễm trùng cũng như cần đối mặt với những vấn đề sức khỏe nguy hiểm khác như ung thư, nhiễm trùng niệu đạo, viêm nhiễm tinh hoàn,... nếu như không nên chữa kịp thời, một số tác hại này có khả năng gây nên những trục trặc nguy hiểm như mất khả năng sinh sản, liệt dương, suy giảm khả năng sinh sản hoặc thậm chí dẫn đến tử vong.

# 1. Sùi mào gà là bệnh gì?

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, gây bởi vi rút virus sùi mào gà (HPV). Sùi mào gà là tác nhân gây ra một số mô bệnh lý sùi hình bông cải hoặc mào gà tạo thành trên nhô lên khỏi da hoặc niêm mạc miệng, cậu bé cũng như tại vùng hậu môn của cả nữ giới và nam giới. Bệnh sùi mào gà có khả năng gây nên không thoải mái, ngứa cũng như đau, cũng như ảnh hưởng đến uy tín đời sống cũng như sức khỏe tâm lý của bệnh nhân. [1]

Theo kết quả thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), bệnh lý sùi mào gà hậu quả đến khoảng 340.000 tới 360.000 người mỗi năm. Trong khi đấy, tình trạng

tại Việt Nam cũng không khả quan hơn khi số ca mắc mới liên tục gia tăng đặc biệt là ở những đô thị lớn. Bệnh có khả năng xuất hiện ở mọi giới, nhất là các đối tượng bị suy giảm sức đề kháng cũng như những đối tượng có hoạt động dục tình.

Sùi mào gà có thể hình thành tại cả nam giới và nữ, tuy nhiên thường dễ dàng nhận thấy hơn tại nam giới. Dưới đây là các khu vực thường thấy bệnh lý sùi mào gà:

- Tại vùng kín: sùi mào gà thường xuất hiện ở các ở tại vùng da cũng như niêm mạc tiếp xúc với viem trong quá trình quan hệ tình dục. vị trí điển hình nhất là quanh cũng như trên cậu nhỏ bên ngoài, như vùng kín, lỗ tiểu, bao quy đầu, bộ phận sinh dục nam, bên trong ở hậu môn, cũng như lỗ ở vùng

hậu môn. Chưa kể đến, tại vùng da nằm giữa âm đạo và hậu môn hoặc bìu bộ phận sinh dục nam cũng như ở hậu môn cũng là một trong những khu vực xuất hiện rất hay gặp của bệnh lý sùi mào gà.

- Da quanh ở tại vùng sinh dục: bên ngoài các vị trí trên, sùi mào gà còn có khả năng tiến triển trên các tại vùng da liền kề, như đùi, hông cũng như tại vùng bụng dưới.
- Miệng và họng: nếu có tiếp xúc với vi rút HPV thông qua hoạt động tình dục miệng, sùi mào gà có thể xuất hiện tại miệng, môi, lưỡi, nướu, cũng như họng.

## **20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới**



Thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25  
- 20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ  
giới, Nam giới



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải thích tư vấn nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn.

## **1.1. Sùi mào gà lây qua con đường nào?**

Bệnh lý sùi mào gà có thể truyền nhiễm thông qua nhiều đường cũng như hình thức khác nhau, bao gồm:

- Quan hệ tình dục: giao hợp tình dục không an toàn là đường lây truyền điển hình nhất của sùi mào gà, kể cả

việc quan hệ vợ chồng qua vùng hậu môn hoặc bằng con đường miệng.

- Tiếp xúc trực tiếp: bệnh lý sùi mào gà cũng có khả năng lây nhiễm lúc tiếp xúc với da hoặc niêm mạc tại vùng kín của người bị nhiễm bệnh, ngay cả khi không có giao hợp.
- Sử dụng chung đồ dùng cá nhân: Việc chia sẻ một số vật dụng cá nhân như khăn tắm, quần áo, đồ lót, bàn chải đánh răng, thiết bị ăn uống,... khiến chúng bị tiếp xúc với người nhiễm bệnh cũng có khả năng là một nguy cơ lây truyền nên chú ý.
- Sinh hoạt ở các nơi có nguy cơ truyền nhiễm cao: dùng chung những dụng cụ làm đẹp (bấm móng tay, dao cạo, kéo, sơn móng tay,...), massage (khăn, giường, các dụng cụ massage,...) hoặc những dịch vụ tiếp xúc da kề da của người nhiễm cùng

có thể là nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm sùi mào gà.

- Lây truyền từ người mẹ sang con: Trong một số hiện tượng ít thấy, sùi mào gà có khả năng lây truyền từ người mẹ bị nhiễm sang con trong quá trình sinh nở.

## **1.2. Bệnh lý sùi mào gà có nguy hiểm tới tính mạng không?**

**KHÔNG.** Bệnh sùi mào gà không gây nên nghiêm trọng đến tính mạng, bệnh thường gây những đốm nâu hồng hình búi nhọn hay đầu bệnh lý sùi mào gà trên vùng kín, âm đạo, dương vật, vùng hậu môn và tại vùng xung quanh miệng. Tuy nhiên, bệnh có thể hậu quả nguy hiểm tới chất lượng cuộc sống của người bệnh như:



- Đau đớn, ngứa và chảy máu: những mụn bệnh sùi mào gà có khả năng gây đau, ngứa, hoặc ra máu khi quan hệ nam nữ hay đi đại tiện.
- tăng khả năng mắc ung thư: những chủng HPV gây bệnh lý sùi mào gà có khả năng liên quan đến nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, vùng kín, dương vật hoặc ở vùng hậu môn.
- Hậu quả tới sinh sản: Bệnh có thể gây hậu quả đến khả năng sinh sản của nữ giới, nhất là với một số đối tượng phụ nữ có thương tổn ở cổ tử cung.
- Hậu quả tới sự tự tin, sức khỏe tâm lý: bệnh sùi mào gà có khả năng gây nên cảm giác bất tiện, mất tự tin cũng như ảnh hưởng tới mối quan hệ tình dục của bệnh nhân.

Xem thêm nội dung liên quan đến 20

Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới,  
Nam giới ở dưới đây:

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà

## **2. Hình ảnh sùi mào gà**

### **2.1. Hình ảnh sùi mào gà ở nam**

Bệnh sùi mào gà là một bệnh lây nhiễm qua con đường dục tình phổ biến ở nam giới, có khả năng dẫn tới những khó chịu, tuy nhiên hiếm khi gây ra các nghiêm trọng đến tính mạng. Một số dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà thường bao gồm một số chấm đỏ hoặc sần sùi tạo ra trên đầu hoặc thân dương vật, bìu, những vị trí xung quanh, tại vùng hậu môn cũng như đằng sau niêm mạc của dương vật. Các nốt/ cụm bệnh sùi này có khả năng khiến bệnh nhân trần trở cũng như cũng có khả năng mang tới một số cơn ngứa cũng như đau rất cho những quý ông.

Sự hình thành của bệnh sùi mào gà ở nam rất hay gặp trên các ở tại vùng da dưới đây:

- Sùi mào gà tạo ra trên niêm mạc sinh

dục như vùng dương vật, bao quy đầu và vị trí xung quanh.

- Một số vùng da bất kỳ trên cơ thể như ngực, bụng, tay, chân cũng như lưng.
- Vị trí tại vùng hậu môn và trực tràng, trên niêm mạc miệng, lưỡi cũng như họng, đặc biệt là tại một số người có phát sinh chuyện phòng the đồng tính nam thông qua đường ở hậu môn cũng như miệng.



Có khoảng 90% cánh mày râu bị sùi mào gà do quan hệ ngoài luồng.

## **2.2. Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở nữ**

Sùi mào gà ở phái đẹp thường bắt đầu bằng một số đốm nhỏ có màu trắng hoặc hồng hình thành trên một số bộ phận sinh dục của cơ thể như vùng kín, vùng kín

ngoài, ở vùng hậu môn cũng như tại vùng chậu. Các đốm này sẽ dần tiến triển thành một số cụm thịt lồi màu da, có đường viền nổi rõ cũng như thường gây ngứa, đau rát cũng như vô cùng không thoải mái. nếu không nên điều trị kịp thời, bệnh sùi mào gà tại nữ giới có thể phát triển thành ung thư, điển hình là ung thư cổ tử cung.

Sự xuất hiện của sùi mào gà có thể xảy ra tại khá nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể của phụ nữ, đặc biệt là ở vùng kín. Dưới đây là các khu vực hay gặp của sùi mào gà ở nữ giới:

- Tại vùng kín: bệnh sùi mào gà thường xuất hiện ở vùng kín, bao gồm cả ở tại vùng vùng kín, ở vùng hậu môn cũng như bên ngoài âm hộ.



- ở vùng đùi: nếu vi rus HPV truyền nhiễm vào lỗ vùng kín, có thể làm sùi mào gà tạo ra vùng tại xung quanh đùi.
- Cổ tử cung: ở những tình trạng nghiêm trọng hơn, bệnh sùi mào gà có khả năng lan rộng lên cổ tử cung của nữ giới.
- Tại vùng hậu môn: nếu như vi rus HPV truyền nhiễm vào con đường ở vùng hậu môn, nó có thể gây nên sùi mào gà ở tại vùng này cũng như một số vị trí xung quanh như phần da giữa ở hậu môn cũng như vùng nhạy cảm.

Song vậy, sự hình thành của bệnh lý sùi mào gà tại phái đẹp có khả năng khác nhau tùy vào từng tình trạng rõ ràng. nếu phái đẹp nghi ngờ mình có bệnh sùi mào gà ở bất kỳ khu vực nào, điều quan trọng

là họ phải tìm kiếm sự chẩn đoán cũng như trị liệu từ chuyên gia phụ khoa để phòng ngừa bệnh lây lan cũng như tác động tới sức khỏe của mình.



Có khoảng 60% phụ nữ bị bệnh sùi mào gà do quan hệ không an toàn.

### **2.3. Bệnh sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục giống hoặc khác**

## nhau?

Không giống nhau. Bệnh sùi mào gà và mụn cóc sinh dục là hai bệnh lý gây do Human Papillomavirus (HPV). Dù cả hai đều là kết quả của sự lan truyền HPV tuy nhiên chúng có một số khác biệt cần thiết về loại HPV gây ra các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng, và một số nguy cơ liên quan.

Bệnh lý sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục đều chủ yếu gây nên bởi một số chủng HPV nguy cơ thấp như HPV type 6 cũng như HPV type 11. Chúng thường tạo ra trên nhô lên khỏi da tại vùng niêm mạc miệng cũng như sinh dục như bộ phận sinh dục nam, vùng kín, ở vùng hậu môn cũng như các ở tại vùng xung quanh. Cả bệnh lý sùi mào gà cũng như mụn cóc

sinh dục thường không gây nguy cơ cao về ung thư, tuy nhiên sẽ dẫn đến cảm giác không thoải mái cũng như đau đớn cho người bị bệnh.

Song vậy, về biểu hiện lâm sàng, bệnh sùi mào gà có hình dạng giống như một số mảng gai nhỏ, chóp nhọn và có thể phát triển thành các khối lớn như mào gà hoặc bông cải.. Trong khi đó, mụn cóc sinh dục có thể hình thành tại rất nhiều hình dạng cũng như kích thước khác nhau, từ mụn nhỏ phẳng chỉ có khả năng quan sát chi tiết với kính hiển vi tới các gai nhô lên trên trên da có khả năng nhìn thấy được.

Cuối cùng, mụn cóc sinh dục và bệnh lý sùi mào gà đều do nhiễm virus HPV, tuy nhiên chúng có một số nguyên do, biểu hiện, khu vực, cũng như phương pháp trị

khác nhau.

## **3. Một số triệu chứng sùi mào gà**

### **3.1. Triệu chứng bệnh lý sùi mào gà ở nữ**

Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh xã hội, do virút dẫn tới u nhú ở người (HPV) gây ra. biểu hiện bệnh lý sùi mào gà ở nữ có thể khác nhau phụ thuộc theo trường hợp, Sau đây là một số triệu chứng thường gặp:

- Xuất hiện một số nốt sùi: những nốt bệnh sùi nhỏ mọc lên ở vùng kín hoặc xung quanh, thường có màu hồng hay da, hình thù giống như cụm sùi của bông cải hay mào gà. Nốt sùi có thể mọc đơn lẻ hoặc thành nhóm.

- Ngứa cũng như khó chịu: phụ nữ bị sùi mào gà thường cảm thấy rằng ngứa cũng như không thoải mái ở vùng kín, đặc biệt khi một số nốt bệnh lý sùi tiến triển cũng như lan rộng.
- Sưng cũng như đau: lúc bị nhiễm sùi mào gà, vùng kín có thể sưng đỏ và đau nhức, gây phiền phức trong quá trình đi nhẹ hoặc chuyện phòng the.
- Xảy ra chảy máu: các nốt sùi mào gà lúc bị tổn thương có khả năng ra máu, đặc biệt sau khi chuyện phòng the hoặc lúc vệ sinh âm đạo.
- Âm đạo tiết ra chất nhầy: phụ nữ bị nhiễm sùi mào gà tại vùng kín thường dẫn tới ở vùng viêm nhiễm, có hiện tượng vùng kín tiết ra chất nhầy không bình thường với màu sắc, độ đặc và mùi khó ngửi lạ.

- Những nốt bệnh sùi có thể xuất hiện ở ầu phần ngoài của âm hộ, bên trong vùng kín, cổ tử cung hoặc tại vùng hậu môn.

Nếu phát hiện biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà, phải tìm đến chuyên gia y tế để được kiểm tra và trị nhanh chóng. Việc dùng các phương pháp bảo vệ an toàn trong chuyện phòng the cũng giúp giảm khả năng lây truyền bệnh lý sùi mào gà và những bệnh truyền nhiễm xã hội khác.

### **3.2. Biểu hiện sùi mào gà tại nam**

Bên dưới là một số biểu hiện cũng như triệu chứng thường xảy ra ở nam giới:

- Xuất hiện nốt sùi: Một trong những dấu hiệu đầu tiên cũng như chi tiết

nhất của sùi mào gà là sự hình thành của các nốt sùi, thường có dạng hình như chùm, cụm thịt có màu hồng hay màu da. Chúng thường mọc tại vùng bìu, quy đầu, dọc theo thân dương vật, lỗ lỗ sáo, ở vùng hậu môn hoặc ở vùng da giữa hậu môn cũng như bìu dương vật..

- Ngứa cũng như khó chịu: những phái mạnh bị bệnh sùi mào gà thường cảm thấy ngứa và không thoải mái ở tại vùng sinh dục hoặc xung quanh lỗ lỗ sáo.
- Đau khi giao hợp tình dục: sùi mào gà có khả năng khiến quan hệ tình dục trở nên đau đớn và khó chịu bởi những nốt bệnh sùi xuất hiện trên đầu hay thân dương vật, bao quy đầu, bìu,...
- Chảy máu: Trong một số tình trạng, sùi mào gà có thể dẫn đến ra máu lúc



chúng bị tổn thương hoặc hình thành vết thương hở trong quá trình quan hệ nam nữ.

- Sưng, đỏ tại vùng sinh dục: một số người có khả năng thấy vùng sinh dục bị sưng cũng như đỏ ửng do bệnh lý sùi mào gà gây những ổ nhiễm trùng hoặc viêm.

Tuy vậy, trong các trường hợp, sùi mào gà có khả năng không có những triệu chứng chi tiết hay không dễ nhận biết đối với cả nam và nữ. Vì thế, việc thăm khám kỹ lưỡng bởi các chuyên gia y tế và thực hiện xét nghiệm là rất cần thiết để chẩn đoán chính xác cũng như điều trị kịp thời.

## **4. Những lý do bệnh sùi mào gà**

### **4.1. Vi rus HPV gây nên sùi mào gà**

Vi rus HPV (Human Papillomavirus) là vi rus dẫn tới u nhú ở người, là một trong các loại vi rút lây truyền thông qua con đường tình dục phổ biến nhất. HPV là tác nhân chính gây ra bệnh lý sùi mào gà, một bệnh truyền nhiễm xã hội thường xảy ra.

Lúc virus HPV xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ xâm nhập những tế bào da cũng như gây ra sự thay đổi bộ gen di truyền của chúng. Điều này có khả năng gây ra hiện trạng tăng sinh tế bào da và gây ra các khối u tuyến tiền liệt (sùi mào gà) ở tại vùng sinh dục cũng như những ở tại vùng da khác trên khắp cơ thể.

## **4.2. Một số yếu tố nguy cơ cao bị bệnh sùi mào gà**

Một số yếu tố nguy cơ cao bị bệnh bệnh sùi mào gà gồm có:

- Các đối tượng chuyện yêu với khá nhiều bạn tình: Người có khá nhiều đối tác tình dục có thể mắc nên bệnh lý sùi mào gà cao hơn so với người thông thường. Bởi con đường dục tình là đường lây nhiễm virus HPV - nguyên nhân chính gây ra sùi mào gà và các bệnh tình dục khác chủ yếu nhất.
- Một số đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có sức đề kháng yếu do có bệnh nền hay người đang thực hiện chữa trị bằng một số thuốc ức chế miễn dịch.
- Một số đối tượng là trẻ nhỏ có sức đề kháng chưa được hoàn thiện cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao bị lây nhiễm HPV cũng như gây ra bệnh sùi

mào gà.

- Những đối tượng mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như Chlamydia có khả năng làm cho tăng nguy cơ nhiễm HIV nếu có phơi nhiễm, khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV xâm nhập cũng như dẫn đến hại; bệnh lậu (Gonorrhoea), giang mai (Sifilis) cũng có khả năng gây các chứng viêm, thúc đẩy sự lan truyền và phát triển của virus HPV, từ đó khiến người bị mắc bệnh dễ mắc bệnh sùi mào gà hơn.
- Một số đối tượng dùng hay lạm dụng chất kích thích như thuốc lá cũng như cồn: Hút thuốc lá và uống rượu bia rất nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, hệ miễn dịch giảm sức đề kháng cũng như dễ dàng bị lây truyền HPV và mắc bệnh sùi mào gà.

- Dùng chung đồ vệ sinh cá nhân: dùng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người bị bệnh sùi mào gà có khả năng lây truyền bệnh.

## **20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới**



Thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25  
- 20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ  
giới, Nam giới



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên đưa ra lời khuyên tư vấn nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn.

## **5. Những thời kỳ tiến triển của sùi mào gà**

Bình thường, bệnh lý sùi mào gà sẽ tiến triển cũng như diễn tiến theo 5 giai đoạn chính sau:

- Tại giai đoạn ủ bệnh: Đây là thời kỳ bắt đầu từ lúc bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc bệnh khởi phát.

khi HPV tấn công vào cơ thể, virút sẽ bắt đầu bám vào những tế bào, khiến các tế bào bị thay đổi gen, làm chúng hoạt động thất thường, không chết đi theo đúng chu kỳ cũng như nhân lên sớm. ở giai đoạn này người bị bệnh bệnh lý sùi mào gà thường không có triệu chứng cụ thể bệnh. Thời gian ủ bệnh của bệnh lý sùi mào gà có khả năng diễn ra trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm căn cứ vào tình trạng sức khỏe của từng người. Trung bình, giai đoạn này thường kéo dài từ 2 đến 9 tháng và điển hình nhất là 3 tháng.

- Tại giai đoạn khởi phát: Đây là giai đoạn tạo ra những dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý sùi mào gà. Thường bắt đầu với sự xuất hiện của các nốt bệnh sùi mào nhỏ, rải rác, thưa thớt.
- Tại giai đoạn phát triển: Trong giai đoạn này, sùi mào gà tiếp tục phát




triển và số lượng nốt bệnh sùi mào gà ngày một tăng lên trên nhô lên khỏi da hoặc niêm mạc và tiến triển thành một số hạt lớn hơn hình thành mào gà. Điều này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục, vệ sinh cá nhân cũng như thi thoảng gây nên căng thẳng, lo sợ cho người bị bệnh.

- Tại thời kỳ biến chứng: Đây có thể được coi là giai đoạn cuối của bệnh lý sùi mào gà. nếu tuyệt đối không điều trị nhanh chóng, sùi mào gà có thể dẫn tới một số biến chứng như sự lây lan của nốt bệnh lý sùi mào gà tới một số bộ phận khác như ở vùng hậu môn, vòm họng hay cổ tử cung ở phái đẹp, dẫn đến ung thư cổ tử cung. Trong giai đoạn này, người bệnh còn tạo ra hiện trạng bội nhiễm, vùng thương tổn do sùi mào gà gây nên bị tiết dịch, lở loét, sưng tấy, dễ chảy máu,...

- Tại giai đoạn tái phát: Sau lúc chữa, có khả năng bệnh sùi mào gà sẽ không hoàn toàn biến mất. Một số người có khả năng gặp sự quay trở lại của bệnh, đặc biệt là khi hệ thống miễn dịch bị suy giảm hoặc lúc cơ thể tiếp xúc lại với vi rus HPV do lối sống quan hệ nam nữ kém an toàn.

Các bệnh nhân sùi mào gà phải được trị đúng cách để giảm nguy cơ tái phát và hậu quả. Hơn nữa, việc sử dụng biện pháp ngăn ngừa như bảo vệ trong chuyện phòng the, tiêm chủng vaccine HPV, giữ vệ sinh vùng kín cũng khá quan trọng để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh.

0988 701 408  
Vừa mới truy cập



Kết quả của xét nghiệm của vc mình như vậy có ổn ko bạn, mình vẫn chưa yên tâm

Cảm ơn bạn thuốc của bạn rất hiệu quả  
18:24



Ok ạ.. Âm tính với hpv là ổn rồi ạ  
18:30

Tin nhắn



## 6. Bệnh sùi mào gà có tác hại không?

- Ung thư

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh xã hội có mối liên hệ mật thiết với ung thư. Bởi bệnh sùi mào gà bên ngoài việc thường gây bởi vi rus HPV type 6 và 11 là một số chủng HPV lành tính, chúng còn gây bởi vi rus HPV type 16 cũng như 18, là 2 chủng HPV nguy cơ cao gây nên ung thư điển hình nhất Ngày nay.

Xem thêm nội dung liên quan đến 20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới ở dưới đây:

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

Theo kết quả thống kê của Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, có khoảng 10,2% nữ giới mắc bệnh sùi mào gà tại cổ tử cung, 5% tại ở hậu môn cũng như 5% tại vùng kín cũng như sẽ tiến triển thành ung thư. Đối với nam giới, 15% hiện tượng mắc HPV phát triển thành ung thư sinh dục gồm ung thư dương vật, tại vùng hậu môn và vòm họng.

## • Ảnh hưởng đến vấn đề mang thai

Bệnh sùi mào gà không trực tiếp dẫn đến hậu quả tới khả năng có thai. Tuy nhiên, bệnh có khả năng dẫn tới một số hậu quả và trực tiếp liên quan tới việc có thai.

- Việc mắc nên sùi mào gà có thể gây thương tổn cho cổ tử cung, tuyến cổ tử cung, tử cung, âm đạo, âm hộ cũng như cả tại vùng hậu môn. Những thương tổn này có thể làm cho giảm tỉ lệ mang thai của phụ nữ bằng cách làm cho giảm độ co bóp của tử cung.
- Nếu bệnh không thể nào phát hiện ra nhanh chóng cũng như chữa trị đúng cách thì có thể dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của phụ nữ khi mang thai. Điều này có khả năng gây ra



sẩy thai, tử vong thai nhi hay sinh non.

- Tăng nguy cơ sứt mép tử cung: những loại HPV có khả năng gây ra các thương tổn ở cổ tử cung, gây hiện trạng sứt mép tử cung, điều này tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non.
- Lan truyền cho thai nhi: Trong quá trình sinh, nếu người mẹ bị sùi mào gà, có khả năng truyền nhiễm cho thai nhi. nếu như bé bị nhiễm HPV, có thể dẫn tới một số ảnh hưởng như viêm phế quản và dạ dày thực quản.

Song vậy, nhiều phụ nữ bị sùi mào gà vẫn mang thai và sinh con thông thường. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa cũng

như có kế hoạch chữa thích hợp.

- Hậu quả khả năng sinh sản

Hiện nay, bình thường nhận thấy sùi mào gà không ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng sinh sản của cánh mày râu hoặc nữ giới. Song vậy, bệnh có khả năng dẫn đến các tác hại đáng lo ngại, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nếu như không được chẩn đoán và trị kịp thời.

Với phái đẹp, bệnh sùi mào gà có khả năng hậu quả đến sức khỏe sinh sản theo những cách sau:

- Bệnh lý sùi mào gà tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến thành ung thư cổ tử cung nếu nguyên do dẫn tới sùi mào gà được xác định do HPV type 16 và 18. Ung thư cổ tử

cung tước đoạt thiên chức làm mẹ của phụ nữ, hậu quả nguy hiểm đến khả năng sinh sản của họ.

- Bệnh có thể dẫn đến tổn thương mô niệu sinh dục, gây nên tăng khả năng nhiễm trùng cũng như nhiễm trùng tại vị trí tử cung, âm đạo hay ở vùng chậu dẫn đến phiền hà trong việc thụ thai.
- Một số dạng giải phẫu trị bệnh lý sùi mào gà (như đốt, tiểu phẫu cắt hay loại bỏ...) có thể dẫn tới thương tổn đến ở tại vùng sinh dục, hậu quả tới chức năng tiếp xúc dục tình hay có thai.

Với phái mạnh, bệnh lý sùi mào gà không được chữa trị nhanh chóng cũng như đúng cách có thể gây ra chứng tắc nghẽn

miệng sáo, tắc nghẽn ống đưa tinh, làm cho biến dạng bộ phận sinh dục nam, làm cho suy giảm nguy cơ sinh sản của cánh mày râu. Một số nghiên cứu còn chỉ ra, virus HPV dẫn đến bệnh sùi mào gà còn có khả năng làm suy giảm nguy cơ chuyển động của tinh trùng, gây ra vô sinh tại phái mạnh.

Việc tiếp cận và chữa trị nhanh chóng bệnh lý sùi mào gà, đồng thời tiến hành việc phòng tránh truyền nhiễm sẽ giúp giảm nguy cơ một số hậu quả gây ảnh hưởng tới chức năng sinh sản và uy tín đời sống sau này.

## **7. Chẩn đoán bệnh lý sùi mào gà**

Chẩn đoán sùi mào có thể giúp người

bệnh tự giác nắm bắt được hiện trạng bị bệnh của bản thân để nhanh chóng tiếp nhận một số phác đồ trị liệu khoa học ở giai đoạn đầu, giúp hiệu quả điều trị bệnh được tối ưu. có khả năng chẩn đoán bệnh sùi mào gà thông qua những dấu hiệu trên lâm sàng sau:

- Xuất hiện một số u nhỏ màu hồng hay màu da, tạo ra thành mụn nước hoặc mọc thành từng nhóm, thường giống như cụm bệnh sùi. Một số u này thường xuất hiện tại âm đạo, bao gồm cậu bé, ở vùng hậu môn, môi, miệng cũng như lưỡi, gây ra cảm giác đau đớn, ngứa ngáy hoặc không thoải mái ở tại vùng có một số u, đôi khi có chảy máu, đặc biệt là lúc chuyện yêu. được sĩ chuyên khoa có thể khám bằng mắt thường để phát hiện những triệu chứng này.

- Sử dụng tinh thể axit axetic: b.sĩ có khả năng sử dụng tinh thể axit acetic để làm sáng một số tại vùng bị nhiễm bệnh sùi mào gà. lúc tiếp xúc với cụm mụn, tinh thể này sẽ biến mụn trở phải trắng sáng, giúp tìm ra nhanh hơn. có thể bôi lên cũng như để trên bề mặt da từ 2 đến 5 phút, riêng với hậu môn là khoảng 15 phút để tinh thể có thể phát huy tác dụng.
- Lấy mô bệnh phẩm: nếu một số cách thức trên không chính xác hoặc chưa đáp ứng, b.sĩ có khả năng lấy trực tiếp một mẫu mô từ các vùng bị nhiễm bệnh lý sùi mào gà (nốt mụn, u nhú,...) để dẫn vào phòng thí nghiệm, phân tích cũng như xem xét bằng kính hiển vi nhằm xem bên trong các nốt bệnh lý sùi có chứa virus gây nên bệnh sùi mào gà hay không? Bệnh đang diễn biến ở thời kỳ nào?.
- Xét nghiệm máu: Xét nghiệm này

được áp dụng với các đối tượng đang nghi ngờ bản thân mắc bệnh sùi mào gà nhưng chưa xuất hiện các dấu hiệu dễ thấy. Mẫu máu của đối tượng được đem đi xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của vi rus HPV.

- Xét nghiệm mẫu dịch: vi rút gây sùi mào gà có thể khu trú trong dịch tiết của người bị mắc bệnh, chẳng hạn như dịch âm đạo tại nữ giới cũng như dịch miệng sáo tại nam), phải việc xét nghiệm mẫu dịch có khả năng xác định được tình trạng lây nhiễm và chuyển biến phức tạp của bệnh.
- HPV Cobas – Test: phương thức này lấy một mẫu tế bào đã chết tại cổ tử cung nữ giới để thực hiện xét nghiệm tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung cũng như thực hiện các xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của vi rus HPV cùng một khi. Công nghệ xét nghiệm HPV Cobas – Test có độ nhạy phát

hiện bệnh và virus dẫn tới bệnh cực kỳ cao có thể lên đến 90-95%.

- Xét nghiệm PCR xác định type HPV: kỹ thuật chẩn đoán này giúp chuyên gia y tế xác định bệnh nhân có nhiễm HPV dẫn đến sùi mào gà hay không? nếu như có, xác định được HPV gây nên bệnh thuộc type nào? Xét nghiệm này được thực hiện qua mẫu bệnh phẩm được lấy từ cổ tử cung, vùng kín hay mảnh sinh thiết ở cổ tử cung nữ giới, mẫu niệu đạo/ dịch miệng sáo tại phái mạnh.

Nếu như phát hiện sùi mào gà từ bất kỳ kỹ thuật nào, dược sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra phương án chữa trị thích hợp, tùy vào mức độ cũng như tình hình của bệnh.

Nếu như nghi ngờ bản thân mắc bệnh bệnh lý sùi mào gà, nên ngay lập tức tới



gặp b.sĩ hoặc dược sĩ để được chẩn đoán cũng như trị liệu nhanh chóng.

## 20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới



Thuốc điều trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25 | 20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới,

Nam giới



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải thích đưa ra lời khuyên nhiệt tình tới khi khỏi hẳn.

## **8. Cách phòng ngừa bị bệnh bệnh lý sùi mào gà**

## **8.1. Tiêm ngừa vắc xin Gardasil/Gardasil 9 để ngăn ngừa virút HPV**

Vắc xin Gardasil và Gardasil 9 là loại vắc xin được dùng để phòng tránh sự xâm nhập của vi rus Human Papillomavirus (HPV), dẫn tới một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vắc xin Gardasil đã được chứng minh là có hiệu quả bảo vệ cũng như đảm bảo tính an toàn sau tiêm cao, đã được ứng dụng tiêm chủng dự phòng một số căn bệnh dục tình do HPV gây ra trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đang có đầy đủ 2 loại vắc xin phòng HPV với hiệu quả bảo vệ cao Hiện tại là Gardasil 4 cũng như Gardasil 9. Trong đó,

Gardasil 4 là vắc xin tứ giá với chức năng bảo vệ cơ thể khỏi 4 chủng virút HPV hay gặp ở người là HPV 6, 11, 16 và 18.

Vắc xin Gardasil có thể phòng những bệnh lý do nhiễm virus HPV như u nhú sinh dục (sùi mào gà, mụn cóc sinh dục), ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng, ung thư vùng hậu môn,... được kê toa dành cho con nít gái và nữ giới trong độ tuổi từ 9 tới 26 tuổi.

Bên cạnh Gardasil 4, còn có vắc xin Gardasil 9 với hiệu quả và phạm vi bảo vệ vượt trội hơn, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi sự lây nhiễm của 9 chủng virus HPV nghiêm trọng cũng như điển hình nhất Ngày nay là HPV type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 cũng như 58.

Chính vì vậy, Gardasil 9 có thể phòng tránh căn bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, ung thư ở vùng hậu môn, các thương tổn tiền ung thư và loạn sản, mụn cóc sinh dục và bệnh lý do nhiễm virus HPV,... với hiệu quả bảo vệ gần như tuyệt đối, lên tới 94%. Vắc xin Gardasil 9 được kê toa tiêm chủng cho trẻ nhỏ nam, con nít nữ, thanh niên nam nữ, mọi người LGBT, MSM,... từ 9 đến dưới 27 tuổi.

## **8.2. Khám sức khỏe định kỳ**

Khám sức khỏe định kỳ là một kỹ thuật quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe tổng thể của mỗi người, đặc biệt là việc tìm ra và phòng ngừa bệnh tật. Trong số các bệnh tật mà kiểm tra sức khỏe định kỳ có khả năng ngăn ngừa được, bệnh sùi mào gà là một trong các bệnh lây nhiễm

tương đối điển hình, đặc biệt trong giới trẻ.

Việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phòng ngừa được bệnh lý sùi mào gà giúp phát hiện nhanh chóng mầm mống gây nên bệnh, từ đó chủ động ứng dụng những phương pháp ngăn chặn sự diễn tiến nguy hiểm của bệnh. Theo khuyến nghị của chuyên gia, phải thực duy trì thực hiện khám sức khỏe định kỳ đều đặn mỗi 6 tháng 1 lần vì cứ chu kỳ nửa năm, cơ thể người lại bắt đầu hình thành các thay đổi đáng kể.

Để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh cao nhất bệnh lý sùi mào gà, người dân cần thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ và tuân theo một số kỹ thuật ngăn ngừa đề xuất bởi những dược sĩ.

## 8.3. Sinh hoạt tình dục lành mạnh

Sinh hoạt tình dục lành mạnh chẳng thể hoàn toàn phòng tránh được bệnh sùi mào gà, nhưng có thể hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nhiễm trùng ở âm đạo do virus gây ra, gọi là virus HPV (Human Papillomavirus). Các phương pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà bằng cách sinh hoạt tình dục lành mạnh bao gồm:

- Sử dụng một số kỹ thuật an toàn khi giao hợp tình dục: sử dụng bao cao su có khả năng giúp giảm khả năng truyền nhiễm HPV trong một số cuộc giao hợp. Tuy vậy, bao cao su không cần là giải pháp 100% an toàn, vì không thể bảo vệ hoàn toàn vị trí chưa được che phủ bởi BCS. Ngoài ra, nên hạn chế tối đa trường hợp quan hệ nam nữ qua con đường miệng.

- Duy trì mỗi giao hợp hôn nhân chung thủy 1 vợ - 1 chồng, không giao hợp tình dục với khá nhiều bạn tính, nhất là với các bạn tình chưa được xác định rõ tình trạng sức khỏe.

## **8.4. Bỏ ngay các thói quen xấu**

Để ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà, nhất thiết phải từ bỏ một số lối sống xấu Bên dưới ngay lập tức, bởi chúng là các điều kiện thúc đẩy cơ thể bị bệnh sùi mào gà:

- Khi quan hệ tình dục không an toàn: sùi mào gà được lây nhiễm chủ yếu thông qua con đường tình dục. phải chú ý dùng BCS trong quá trình giao hợp và chỉ nên phát sinh chuyện phòng the với 1 bạn tình đã thử nghiệm sức khỏe an toàn.



- Chia sẻ đồ dùng cá nhân: những thiết bị như dao cạo, khăn tắm, quần áo nội y nên dùng riêng, không chia sẻ với người khác để tránh tiếp xúc trực tiếp với các tế bào bị nhiễm HPV, nguyên nhân gây ra bệnh sùi mào gà.
- Lối sống kém lành mạnh: giảm thiểu những cuộc vui, ăn chơi với nhiều người, không tạo ra trong môi trường rất nhiều nguy cơ dẫn đến bệnh như quán bar, hộp đêm.
- sử dụng chất kích thích như hút thuốc và uống rượu bia: Hút thuốc lá và uống quá nhiều rượu bia có khả năng làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể, dễ dàng dẫn tới các bệnh lý, trong đó có bệnh lý sùi mào gà.
- Thói quen xấu khi vệ sinh cơ thể: cần vệ sinh cơ thể hàng ngày, chăm chỉ thay quần áo, thường xuyên lau rửa vùng kín giúp phòng ngừa nguy cơ

mắc bệnh lây lan từ tế bào HPV.

## **9. Một số phương thức chữa trị sùi mào gà**

Mặc dù sùi mào gà tất cả đều triệu chứng qua các biểu hiện là nốt sùi không nguy hiểm nhưng bệnh vẫn có thể dẫn tới rất nhiều biến chứng nguy hiểm nếu như lý do gây bệnh là các chủng virus HPV thuộc phân nhóm nguy cơ cao gây ung thư.

Đối với các hiện tượng bệnh tuyệt đối không chăm sóc đúng cách cũng như điều trị nhanh chóng, bệnh lý sùi mào gà có thể phát triển nặng nề hơn, gây nên biến dạng ở chỗ (niêm mạc miệng, cậu nhỏ, hậu môn, vòm họng,...) hoặc phát triển thành ung thư biểu mô tế bào vảy dạng nhú (sùi mào gà khổng lồ), một số nốt sần

dạng Bowen, loạn sản,...

Ngoài ra, bệnh lý sùi mào gà còn dẫn đến cản trở quá trình sinh nở, gây ra hại cho thai nhi. Vì thế, dù nặng hay nhẹ, bệnh lý sùi mào gà cần được chú ý chăm sóc đúng cách cũng như tiến hành điều trị càng sớm càng tốt. Một vài phương thức điều trị bệnh sùi mào gà phổ biến Hiện nay gồm có:

- Chữa trị bằng thuốc: Có khá nhiều loại thuốc có khả năng dùng để chữa trị bệnh lý sùi mào gà, bao gồm kem bôi thoa, thuốc,.. với lợi ích làm khô cũng như làm cho rụng một số u bệnh sùi. Những thuốc đặc trị liệu bệnh sùi mào gà chủ yếu như Podophyllotoxin (podofilox), Imiquimod, Sinecatechins, Bichloroacetic acid (BCA), Trichloroacetic acid (TCA) nồng độ cao từ 80-90%,... Trong đó,

phổ biến nhất là podofilox được dùng ngoài da với khả năng dẫn đến độc chết tế bào gây ra hại ở chỗ, khiến chúng ngừng phân chia, khiến mô bị hoại tử cũng như tự tiêu biến.

- Trị bằng phác đồ đốt điện (Electrocautery): kỹ thuật này dùng dòng điện để làm cho nóng và đốt cháy một số u bệnh sùi, tiêu diệt virus gây bệnh.
- Điều trị bằng phẫu thuật: kỹ thuật này được sử dụng để phẫu thuật cắt bỏ những khối/ mảng/ cụm/ nốt bệnh lý sùi mào gà tại chỗ. Đây là phương thức phù hợp để ứng dụng cho một số tình trạng chưa đáp ứng với những kỹ thuật khác.
- Chữa trị bằng đơn thuốc lạnh (Cryotherapy): Là cách thức dùng nhiệt độ cực thấp bằng cách xịt nitơ lỏng lên ở vùng bị tổn thương do

bệnh lý sùi mào gà dẫn tới để dẫn tới đông lạnh, làm hư hại tế bào sùi mào gà, như vậy làm cho rụng các u. cách thức này rất an toàn, có thể áp dụng để trị cho một số đối tượng là phụ nữ đang có thai, song vậy phương thức này lại gây nên rất nhiều bất tiện sau khi thực hiện như có thể gây nên hoại tử tế bào, đau đớn, bỏng lạnh, rát, dẫn đến bọng nước cũng như để lại sẹo.

- Trị bằng laser CO2 (Vaporization): cách thức này dùng tia laser để đốt cũng như làm sạch các khối u bệnh lý sùi mào gà.
- Tăng cường/ điều hòa hệ miễn dịch: Bổ sung vitamin C, E, A, Zinc, Selenium và L-Arginine để tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại HPV cũng như giảm nguy cơ quay trở lại bệnh lý sùi mào gà. hay dùng một số loại thuốc bôi bên ngoài da hay

dạng tiêm để điều hòa miễn dịch trên các ổ tại vùng tổn thương do bệnh lý sùi mào gà gây nên như Interferon, Imiquimod, Sinecatechin, ...

Xem thêm nội dung liên quan đến 20 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới ở dưới đây:

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

Cần tìm hiểu kỹ về phương thức điều trị bệnh sùi mào gà nào thích hợp nhất với tình hình của mình cũng như tham khảo ý kiến của bác sĩ trước lúc tiến hành trị.



## 10. Cách chăm sóc bệnh nhân sùi mào gà

Để chăm sóc bệnh nhân bệnh lý sùi mào gà, có thể tham khảo thực hiện một số biện pháp sau đây:

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân: người mắc bệnh phải giữ vệ sinh âm đạo sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày bằng nước ấm và xà phòng không nguy hiểm với da. Tránh dùng đồ dùng cá nhân chung như khăn tắm, quần áo với người khác để tránh lây truyền.
- Trị đúng cách: bệnh nhân nên tham khảo ý kiến chuyên gia để được kê toa trị phù hợp. Có rất nhiều cách thức chữa trị bệnh sùi mào gà như nhiệt trị liệu điện, chữa trị bằng laser, quang động điều trị, hay sử dụng thuốc bôi đặc chữa trị,... bệnh nhân cần tuân thủ đúng quy trình trị,

không tự ý dừng thuốc hay thay đổi liều lượng.

- Giảm thiểu giao hợp tình dục: người bị mắc bệnh cần hạn chế đời sống chăn gối để tránh lây truyền cho đối tác cũng như tránh làm tổn thương tại vùng bệnh. nếu như quan hệ, phải sử dụng BCS hay màng chắn y khoa.
- Giảm stress: Cân bằng đời sống, giữ tâm trạng thoải mái, ăn uống cũng như sinh hoạt đúng giờ giúp cơ thể giảm căng thẳng, tăng cường sức đề kháng để chống lại virus.
- Bổ sung dinh dưỡng: Ăn khá nhiều rau, quả, hạt, chất xơ cũng như protein; tránh thực phẩm giàu con đường, chất béo và đồ ăn nhanh để cải thiện sức khỏe và giúp đỡ chữa.
- Hỗ trợ tinh thần: Động viên, an ủi và giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình trị


để họ không cảm thấy cô đơn hay áp lực.

- Theo dõi cũng như kiểm tra: người mắc bệnh nên tham khảo ý kiến b.sĩ định kỳ trong quá trình trị liệu cũng như sau khi hoàn thành điều trị để đảm bảo hiệu quả và theo dõi sát sao bất kỳ biến chứng nào có khả năng xảy ra, từ đấy dẫn ra một số phương pháp xử lý kịp thời.

Vừa mới

0988701408

18:11 Hôm nay



Nhà Thuốc Bình Tâm

Được sĩ tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ



Tin nhắn



## 11. Các câu hỏi rất hay gặp về bệnh sùi mào gà

- Sau lúc bị nhiễm HPV bao lâu thì bệnh sùi mào gà xuất hiện?

Trong các hiện tượng, bệnh lý sùi mào gà có khả năng xuất hiện từ vài tuần tới vài tháng sau khi tiếp xúc với vi rút. Tuy nhiên, có một số người có thể không bao giờ tiến triển bệnh lý sùi mào gà dù đã nhiễm HPV.

Trong một số trường hợp, hệ thống miễn dịch của cơ thể có khả năng tiêu diệt vi rút HPV trước lúc nó gây nên bất kỳ triệu chứng hoặc tác hại nào, trong khi các trường hợp khác có thể tiến triển bệnh sùi

mào gà và một số tác hại liên quan.

Nếu như bạn trần trở về tình trạng sức khỏe của mình hoặc nghi ngờ rằng bạn có khả năng đã tiếp xúc với HPV, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế hoặc b.sĩ để được kiểm tra và lời khuyên điều trị thích hợp.

- Bệnh lý sùi mào gà có khả năng tự khỏi không?

**KHÔNG.** Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ cách thức hoặc loại thuốc nào có khả năng trị đặc hiệu bệnh lý sùi mào gà. Bởi tác nhân chính gây nên sùi mào gà là những chủng virus HPV, Vì thế để điều trị được sùi mào gà, nhất thiết phải chữa trị dứt điểm sự hiện diện cũng như gây ra hại của các chủng virút này. Nhưng ở thời điểm Hiện

nay vẫn chưa có phương thức trị liệu triệt để HPV, vì thế sùi mào gà không thể tự khỏi phải việc phòng ngừa là yếu tố được ưu tiên tốt nhất đối với loại bệnh cực kỳ dai dẳng cũng như khó chịu này.

- Sùi mào gà có để lại sẹo không?

có khả năng. Dù bằng cách thức trị liệu nào, bệnh sùi mào gà vẫn để lại sẹo, bởi đây là một số tổn thương tại cấp độ tế bào, khó có khả năng lành lại như trạng thái ban đầu. Song vậy, vẫn có khả năng lưu ý các phương pháp sau để hạn chế cao nhất sự mất thẩm mỹ của sẹo do bệnh sùi mào gà để lại gây nên ra:

- Chọn kỹ thuật chữa trị phù hợp với tình hình bệnh lý của bản thân, phải tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên

khoa để dẫn ra quyết định chính xác nhất.

- Sau khi điều trị, nên chú ý chăm sóc vết thương đúng cách để vết thương mau lành cũng như giảm nguy cơ để lại sẹo lớn, mất thẩm mỹ.
- Ngừng dùng thuốc trị hay thay đổi phương pháp điều trị theo kê toa của chuyên gia y tế nếu như thấy kết quả không như mong muốn hoặc có các hậu quả không mong muốn xảy ra.

Kiên trì thực hiện chữa cho đến khi bệnh lý sùi mào gà hoàn toàn biến mất, để tránh sự tái phát của bệnh và làm cho tăng tỉ lệ để lại sẹo.

Sùi mào gà không chỉ gây nên các dấu hiệu bệnh lý sùi lành tính trên bề mặt da



mà còn dẫn tới rất nhiều ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, tâm lý, gây các hậu quả nghiêm trọng như viêm nhiễm, biến dạng bộ phận sinh dục, sinh ung thư, hậu quả xấu tới chức năng sinh sản tại cả nam giới và nữ giới giới.

Vì thế, đối với bệnh sùi mào gà, ngăn ngừa là cách đối mặt hàng đầu, giúp cơ thể dự phòng được sự tiến công cũng như gây ra hại của virus HPV - lý do chính gây ra bệnh lý sùi mào gà cũng như một số bệnh lây qua con đường dục tình chủ yếu và nguy hiểm nhất Hiện nay.